

Beestjes en ziektes



Teken

Herkenning: spinachtige, in volgezogen toestand: grootte van een druivenpit (0,5cm)

- komen voor in heel Europa
- het ganze jaar door actief
- kunnen ziektes overdragen zoals:
 - o Borreliose (ziekte van Lyme)
 - o Babesiose (Piroplasmose)
 - o Ehrlichiose



Zandvliegen of flebotomen

Herkenning: kleine harige mug (2,5-3mm lang), zoemt niet.

- mediterrane landen
- 's avonds en 's nachts actief
- overdragers van Leishmania



Hartwormmuggen

Herkenning: steekmug, lange poten, vooral 's avonds actief.

- komen wereldwijd voor
- overdragers van *Dirofilaria immitis* (= de hartworm) (voornamelijk in Zuid-Europa)



Scalibor
Deltamethrine

Langdurige bescherming voor de hond en zijn familie

- teken - zandvliegen - hartwormmuggen
- 1 handeling = 5-6 maanden bescherming
- geurloos, bestand tegen water



THERAPEUTISCHE INDICATIE: preventie van teken (*Ixodes ricinus*; *Rhipicephalus sanguineus*) gedurende 5 tot 6 maanden. Preventie van bloedzuigen door flebotome zandvliegen (*Phlebotomus perniciosus*) gedurende 5 tot 6 maanden. Anti-voedingseffect op volwassen muggen (*Culex pipiens pipiens*) gedurende 6 maanden.

LEES AANDACHTIG DE BIJSLUITER. NOG MEER WETEN? VRAAG HET AAN UW DIERENARTS.