


OPLOSSEN VAN PORCILIS LAWSONIA, ZO WERKT DAT!

Stap voor stap toegelicht.


50 DOSERINGEN PORCILIS LAWSONIA OPLOSSEN IN SOLVENS.

In 5 stappen

- 1** Laat het oplosmiddel (solvens) opwarmen tot tenminste kamertemperatuur en bij voorkeur **lichaamstemperatuur (ca. 39°C)** en **schud goed** voor gebruik.




- 2** Voeg 5-10 ml van het solvens toe aan de flacon met **Porcilis Lawsonia** (gevriesdroogd vaccin), zodat het tabletje oplost.



- 3** Meng kort.



- 4** Voeg de gemengde oplossing toe aan de flacon met solvens.



- 5** Schud kort om alles goed te mengen.



Klaar voor gebruik:

Bevat 50 doseringen van 2 ml
Porcilis Lawsonia.


50 DOSERINGEN PORCILIS LAWSONIA

OPLOSSEN IN 50 DOSERINGEN PORCILIS PCV M HYO

In 5 stappen


1

Laat het vaccin Porcilis PCV M Hyo opwarmen tot tenminste kamertemperatuur en bij voorkeur **lichaamstemperatuur (ca. 39°C)** en **schud goed** voor gebruik.



2

Voeg 5-10 ml Porcilis PCV M Hyo toe aan de flacon met **Porcilis Lawsonia** (gevriesdroogd vaccin), zodat het tabletje oplost.




3

Meng de flacon Porcilis Lawsonia kort.



4

Voeg de gemengde oplossing toe aan de flacon met Porcilis PCV M Hyo.



5

Schud kort om alles goed te mengen.



Klaar voor gebruik:

3-in-1 combivaccin: Bevat 50 doseringen van 2 ml.
Beschermt tegen PIA, circo en mycoplasma
(*Lawsonia intracellularis*, PCV2 en
Mycoplasma hyopneumoniae).


100 DOSERINGEN PORCILIS LAWSONIA

OPLOSSEN IN 100 DOSERINGEN **PORCILIS PCV M HYO**

In 5 stappen


1

Laat het vaccin Porcilis PCV M Hyo opwarmen tot tenminste kamertemperatuur en bij voorkeur **lichaamstemperatuur (ca. 39°C)** en **schud goed** voor gebruik.



2

Voor 100 doseringen vaccin zijn 2 flacons Porcilis Lawsonia nodig. Voeg 5-10 ml Porcilis PCV M Hyo toe aan beide flacons met **Porcilis Lawsonia** (gevriesdroogd vaccin), zodat het tabletje oplost.




3

Meng beide flacons Porcilis Lawsonia kort.



4

Voeg de gemengde oplossing, uit beide flacons, toe aan de flacon Porcilis PCV M Hyo.



5

Schud kort om alles goed te mengen.



Klaar voor gebruik:

3-in-1 combivaccin: Bevat 100 doseringen van 2 ml.
Beschermt tegen PIA, circo en mycoplasma
(*Lawsonia intracellularis*, PCV2 en
Mycoplasma hyopneumoniae).

KIES DE JUISTE NAALD

Kies de naaldlengte en -dikte op basis van de leeftijd van het dier:

Eén dosering van 2 ml gemengd vaccin kan vanaf 3 weken leeftijd via een intramusculaire injectie in de nek van het varken worden toegediend.

AANBEVOLEN NAALDFORMATEN VOOR VARKENS

Diercategorie	Gewicht	Lengte		Dikte	
		In mm	In inch	In gauge	In mm
Zogende big	<5 kg	13	1/2	20	0,8
Gespeende big	5-12 kg	16	5/8	18	1,1
Opfokbig	12-30 kg	19	3/4	18	1,1
Vleesvarken/gelt	>30 kg	25-38	1-1 1/2	16	1,4
Zeug/beer*	>110 kg	50	2	16	1,4

*De veiligheid van het diergeneesmiddel is niet bewezen tijdens dracht of lactatie.



Gebruik het opgeloste vaccin binnen 6 uur.
Zorg dat er geen vaccin overblijft. Dit is later niet meer bruikbaar.



Bewaar zowel het vaccin als het solvens in de koelkast!

Kijk voor meer informatie op
www.pia-preventie.nl.

PORCILIS[®] Lawsonia

EFFECTIEF, BETROUWBAAR, GEMAKKELIJK



Porcilis PCV M Hyo bevat per dosis van 2 ml: Porcine circovirus type 2 (PCV2) ORF2 subunit antigeen: ≥ 2.828 AU; Geïnactiveerd Mycoplasma hyopneumoniae stam J: $\geq 2,69$ RPU. **Doeldier:** Varken. **Indicatie:** Actieve immunisatie ter vermindering van viremie, virusload in longen en lymfatisch weefsel, virusverspreiding door PCV2 infectie, en de ernst van longbeschadigingen door infectie met *Mycoplasma hyopneumoniae*. Ter vermindering van de gewichtsafname gedurende de vleesvarkensperiode ten aanzien van infecties met *Mycoplasma hyopneumoniae* en/of PCV2 (zoals waargenomen in veldstudies). Aanvang immuniteit / immuniteitsduur: 2/22 weken PCV2, 4/21 weken *M. hyopneumoniae*. **Bijwerkingen:** Een voorbijgaande verhoging van de lichaamstemperatuur wordt zeer vaak waargenomen. Milde systemische reacties (verminderde activiteit, neiging om te gaan liggen en geringe tekenen van ongemak) of voorbijgaande lichte zwelling (< 2 cm) op de injectieplaats, tot één dag na vaccinatie. In zeer zeldzame gevallen anafylaxie-achtige reacties. **Toediening en dosering:** Vanaf de leeftijd van 3 weken een enkelvoudige dosis van 2 ml, IM in de nek. **Wachtermijn:** 0 dagen. **Waarschuwingen:** Vaccineer alleen gezonde dieren. Dit diergeneesmiddel bevat minerale olie. Raadpleeg in geval van accidentele injectie onmiddellijk een arts. Zorg ervoor dat u de bijsluiter bij u heeft. REG NL 114735 (EU/2/14/175/001-010) UDD. Voor overige informatie, zie bijsluiter. 2017-11.

Porcilis Lawsonia, bevat per dosis geïnactiveerd *Lawsonia intracellularis* stam SPAH-08 ≥ 5323 U. **Doeldier:** Varken. **Indicatie:** Actieve immunisatie ter vermindering van: diarree, verlies van dagelijkse gewichtstoename, intestinale laesies, bacteriële uitscheiding en mortaliteit veroorzaakt door *Lawsonia intracellularis* infectie. Aanvang/duur immuniteit: 4/21 weken na vaccinatie. **Contra-indicaties:** Geen. **Bijwerkingen:** Een verhoging van de lichaamstemperatuur (gemiddeld 0,6 – 1,0 °C, bij individuele varkens tot 2,5 °C) komt zeer vaak voor en verdwijnt binnen één dag na vaccinatie. Reacties op de toedieningsplaats (zwelling <5 cm), kunnen vaak optreden en verdwijnen binnen 23 dagen. **Toediening en dosering:** Vanaf de leeftijd van 3 weken 2 ml IM. Reconstitueer het lyofilaat in suspensievloeistof of in Porcilis PCV M Hyo. **Wachttijd:** 0 dagen. **Waarschuwingen:** Dit vaccin kan worden gemengd met Porcilis PCV M Hyo en toegediend vanaf 3 weken leeftijd. In geval van accidentele zelfinjectie dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd. REG NL 123502 UDD. Voor overige informatie, zie bijsluiter. 2019-12.