


REPIDOSE™: een weideseizoen lang bescherming tegen wormen.



Repidose is de praktische oplossing voor worminfecties bij jongvee. Jongvee dat vroeg wordt uitgeschaard en laat wordt opgesteld kan, met één bolus bij het uitscharen, effectief worden beschermd tegen worminfecties tijdens het weideseizoen. Belangrijk is dat alle dieren uit de koppel een bolus krijgen en dat er tijdens het seizoen geen dieren, zoals droge koeien, die niet met Repidose zijn behandeld, aan de koppel worden toegevoegd.

Repidose is er in 2 presentaties:

- Repidose 5, voor dieren van 100-250 kg;
- Repidose Forte, voor dieren van 250-400 kg.


Om onderdosering te voorkomen dient de juiste bolus aan het juiste dier te worden toegediend. Onderstaande tabel biedt daartoe houvast.

Levend gewicht in kg			
HF	MRV	Leeftijd	Borstomvang
49	50		80
68	70	ca. 2 maanden	90
90	94		100
117	122		110
149	157	ca. 5 maanden	120
186	197		130
228	244	ca. 8 maanden	140
275	298		150
329	352	ca. 14 maanden	160
389	414	inseminatie	170

Repidose dient niet te worden toegediend aan drachtige of melkgevende runderen, van het residuverloop in melk zijn geen gegevens bekend.

Eigenschappen:

De bolus bevat vijf afzonderlijke tabletten oxfendazole, die met tussenpozen van ongeveer 3 weken vrijkomen. Repidose werkt dus pulsgewijs, tussen behandelingen kan jongvee worden blootgesteld aan larven op de weide en kunnen ze weerstand opbouwen.



Ongeveer 21 dagen na toediening van de bolus komt de eerste tablet ontwormingsmiddel vrij. Wormen die in de voorafgaande 3 weken werden opgenomen, worden daardoor gedood. 3 weken later gebeurt dit opnieuw.

In totaal wordt het jongvee 5x ontwormd en aldus afdoende beschermd tegen de schadelijke effecten van een wormbesmetting. Ondertussen groeien de dieren ongestoord door.

Voordelen:

- 1 maal toedienen = 5 maal ontwormen
- Actief tegen long- en maagdarmwormen
- Zorgt voor een ongestoorde groei
- Immuñeitsopbouw mogelijk

Repidose 5, Repidose Forte, bolus voor runderen, bevat per bolus 5 tabletten van: 750 of 1250 mg oxfendazol. **Doeldier:** Niet-melkgevend rund. **Indicatie:** Ontworming van runderen van 100-250 (Repidose Forte 250-400) kg lichaamsgewicht. Bestrijding van volwassen en larvale stadia van maagdarmwormen, longwormen en lintwormen bij rundvee tijdens het weideseizoen. Maagdarnematoden: *Ostertagia* spp., *Trichostrongylus* spp., *Haemonchus* spp., volwassen stadium van *Oesophagostomum* spp., *Cooperia* spp., *Capillaria* spp., *Nematodirus* spp., volwassen stadium van *Bunostomum* spp., *Chabertia* spp. Longworm: *Dictyo-caulus viviparus*. Lintworm: *Moniezia* spp. **Contra-indicaties:** Niet toedienen aan niet-herkauwende dieren. **Bijwerkingen:** Geen bekend. **Toediening en dosering:** Eenmalig oraal 1 bolus per dier met behulp van een pillenschietertoe te dienen bij het begin van de weideperiode. De eerste dosering komt omstreeks 21 dagen na toediening vrij. **Wachttijd:** (orgaan)vlees: 7 maanden. Niet gebruiken in runderen die melk produceren voor humane consumptie, ook niet tijdens de droogstand. Niet gebruiken tijdens de laatste 7 maanden van de dracht in drachtige vaarzen die bestemd zijn als melkvee. **Waarschuwingen:** Het is mogelijk dat als de dieren kort na een behandeling een grote hoeveelheid infectieuze longwormlarven opnemen, zij binnen 14 dagen de klinische symptomen van een longworminfectie gaan vertonen. Alle dieren in een koppel behandelen. Niet samen toedienen met andere boli. REG NL 5043/5299 URA. Voor overige informatie, zie bijsluiter.